

Otázka: Chov prasnic jalových, zapařtěných, březích, rodících a kojících

Předmět: Chov zvířat a veterinářství

Přidal(a): Baruu

Ustájení - musí splňovat welfare zvířat

- nesmí se zraňovat
- poskytovat optimální plochu
- dobré pracovní podmínky pro ošetřovatele
- bezstelivové rořtové ustájení
- napáječka, koryto

Jalové prasnice

- 7-10 dnů
- ustájení ve skupině po 10 ks
- ustájení celorořtové nebo polorořtové (statek Měřice)

Zapařtěné prasnice

- 30-35 dnů
- ustájení individuální
- eros centrum
- podlaha celá betonová, polorořtová nebo celorořtová

Březí prasnice

- od detekce gravidity do 10 dní před porodem
- 70-75 dnů
- ustájení skupinové
- a) stabilní skupina- 10 ks prasnic, celoroštový nebo poloroštový kotec
- b) dynamická skupina
 - 200 ks prasnic, odebírají a přicházejí neustále
 - kotec- zóna klidu- pevná podlaha
 - zóna krmení- automatický krmný box, rošty

Ustájení i na hluboké podestýlce

- -> starý objekt
- Přistýlá se 2-3 týdně
- Vývoz 1 za měsíc
- Skupina 15-20 ks, Vynikající pro welfare zvířat
- Krmení
- Ovlivňuje výsledky reprodukce až o 20%
- Kompletní krmné směsi
- Prasnice se krmí restrektivně
- Teplota 18-22 C ve stáji

Typy krmení

- tekuté – kompletní krmná směs se smíchá s vodou
- suché dávkování (odsypané)
 - dávkovač nasype KD do koryta
 - březí prasnice BIO-FIX-> krmná místa u koryta oddělena přepážkou slouží k tomu, aby se při krmení nerušily a snědly vše
 - automatické krmné boxy
 - nejmodernější typ (suché, tekuté i zvlhčované krmivo)
 - stelivové i bezstelivové provozy
 - řízené počítačem
 - pro fungování musí mít čip (v uchu, za uchem nebo uložené pod kůží)
 - prasnice vlezí do boxu-> box ji identifikuje kvůli čipu-> nasype jí krmivo-> prasnice krmivo sežere (box sleduje, jak rychle žere a váží nedožerky)->

vypustí ji

- selekční koncovka
 - slouží k oddělení jednotlivých prasnic od zbytku stáda
 - převod na porodnu, zákrok, kontrola zdraví

Krmení jalových a zapuštěných prasnic

- Výživa->řádně zabřeznutí a správnou fce reprodukčních orgánů
- Kompletní krmná směs KPB 3,2-3,5kg denně
- Krmí se 2 denně
- Flushing - u hubených a vyčerpaných prasnic
 - Velice dobře působí na prasničky
 - Zvýšená krmná dávka 50-100%
 - Týden před zapuštěním
 - Zvýší se počet ovulovaných vajíček-> zvýší se počet zahnížděných plodů v děloze

Krmení březích prasnic

Zajistit

- záchovu pro prasnici
- růst plodu
- rozvoj dělohy a mléčné žlázy
- přírůstek prasnice

Velice důležité

- ½ březosti se vytváří rezervy pro růst selat a průběh laktace
- KPB 2,2-2,6 kg
- 2/2 nepřekrmovat-> ztloustne-> komplikace při porodu
- Krmí se 2 denně

Ošetřování

- **Jalové prasnice**
 - Hlídání ZD
 - Kvalitní výživa
 - Ošetřování
 - Optimální podmínky prostředí
 - Detekce říje
 - Zapuštění
- **Zapuštěné prasnice**
 - Detekce gravidity
 - Nedostaví se říje po 21 dnech
 - Detekce říje nejdříve cca 30 dnů
 - Březost zjišťujeme ve slabinách a přítomnost plodových obalů
- **Březí prasnice**
 - Chránit před nastydnutím, klid, čistota prostředí
 - Chov rodičích a kojících prasnic
 - Velice náročný

Ustájení

- Zařízení-> porodna
- Skupinové
 - U nás velice málo
 - Stelivový způsob
 - Maximální welfare
 - 4-6 prasnic
 - Oprasit by se měli během jednoho týdne
 - Selata se odtavují v 5-6 týdnech
- Individuální
 - Nejrozšířenější
 - Stelivové a bezstelivové (bez častěji)
 - Umisťuje 5 dní před porodem
 - Klece jsou nastavitelné
 - Fixace- omezení ztrát zalehnutí selat
 - Kolíková napáječka, koryto
 - Podlaha plná nebo roštová (před korytem musí být pás plné podlahy, pod kotcem)

je vana se špuntem-> výkaly tečou do jímky)

- Rošty jsou nejčastěji plastové
- Krmení-kvalita krmení je důležitá kvůli selatům
 - kompletní krmná směs
 - zakládá se individuálně, dávkovaček (pro 1-2 prasnice)
 - může být použit zvlhčovač krmiva

a) prasnice rodičí- nesmí se týden před porodem překrmovat (záněty dělohy, mléčné žlázy, zadržování mléka)

- KPK 2,2-2,6 kg 2 denně, musí být k dispozici voda
- v den porodu a v den před porodem se nekrmí nebo 50% KD

b) kojící prasnice- musí se zajistit produkce mléka za celou dobu

- záchovu a regeneraci pohlavního aparátu
- úspěšné zabřeznutí
- prasnice z něj musí tvořit mléko
- krmí se KPK- první 3 dny 2,2-2,6kg, poté se postupně zvyšuje podle toho kolik kojí selata (na 1 sele + 0.3-0.4kg) průměrně 5,6 kg
- 3 dny pře odstavem se dávka snižuje
- v den odstavu se nekrmí
- po odstavu KPK 2,2-2,6 kg
- důležité v KD tuk (zdroj energie a AMK)

Ošetřování

- Nejnáročnější na ošetřování
- Desinfekce porodního kotce
- Šetrný přesun na porodnu
- Porod pod dohledem chovatele
- ZOOhygienu porodny
- Nestresovat

- Příprava na odstav