

**Otázka:** Chov telat

**Předmět:** Chov skotu

**Přidal(a):** čaky

Kategorie telete je od narození do půl roku stáří

**Rozhodující období:** největší ztráty

**2 typy ztrát:**

- **1) Přímé:** úhyn telete
- **2) Nepřímé:** snížení přírůstku, snížení zdravotního stavu, užitkovost

Správné ošetření po porodu

**Rozdělení období odchovu:**

- minimální standarty vyhláška číslo 2008/04

**Časové členění:**

**1.období:** Do odstavu

- Max do 56 dne věku., mlezivo, mléčné směsi

**2.období:** Přejícné školkové

- Do 57 max do 90 dne věku

### **3.období:** Odstavu

- Do 90-180 dne, období rostlinné

### **Ustájení telete**

#### **Období mléčné výživy:** individuální odchov

Optimální jsou venkovní boxy

#### **Typy venkovních boxů**

##### **a) dřevěné**

- - špatné udržování čistoty, malá trvanlivost
- + přírodní materiál, méně finančně náročné po použití je schopný recyklace

##### **b) plast z vysoce kvalitního plastu**

- + snadno čistitelné. prodyšné, dobré mikroklima, lehký na manipulaci
- - finančně náročnější

##### **c) Plachtovna:**

- + finančně méně náročné při poškození lze opravovat, vyměnit, lehká manipulace
- - horší mikroklima, možnost poškození,

##### **d) individuální boxy pod přístřeškem**

#### **Dřívější již nevhodné technologie**

- Profylaktorium: oddělená místnost, byli tam individuální klece
- Vazně s matkou: matka stála u žlabu tele bylo u ní uvázané nevhodné

## Velkokapacitní teletníky:

- všechna telata z celého okresu, všichni po spolu

## Období mléčné

- Úplně 1. krmení je mlezivo-první napití nejpozději do 205 hodin po narození (propustnost tenkého střeva nejvíc obranných látek)
- Na 1 napití by mělo vypít 1 kg mleziva (pozor na přepití)
- V prvních dnech 6-7\* spotřeba minimálně 6-7 kg
- Musí být teplé minimálně 37 C
- Hygiena napájení bezpodmínečná po každém použití důkladně vymýt vždy čisté
- Po skončení mlezivové výživy nastává krmení mlékem

### 1. opravdu mlékem:

- krmení nejdražší, není trvanlivé, nejpracnější způsob, musí být čerstvé nebo úplně zkyslé(nesmí být hořké)teplé 37-38 C

### 2. krmení mléčnou krmnou směsí:

- běžně se vyrábějí, připravují se vždy čerstvé množství na 1 krmení, je vždy sypká a suchá

**Začínáme krmit i jadrné krmivo:** tzv Předstartér podává se už od 5-10 dne věku

## Období přechodné

„školkové“

## Typy ustájení:

- 1) skupinové boxy venkovní: plastové, dřevěné
- 2) přístřešky

**Krmení:** období mezi mléčnou a rostlinou výživou převážně už rostlinná složka, dostatek pitné vody neomezeně

## Období pod odstavu

Nekrmí se mléko jsou odstavena pouze rostlinné krmivo (kvalitní seno, zelená píce, siláž, senáž v zimě okopaniny hlavně krmná mrkev a částečně řepa) v 5 měsících plně vyvinuty všechny trávicí orgány krmení 2\* denně, stejná technologie, která bude použita jako v budoucím odchovu

## Pravidlo 2,5

- 2,5 minuty-zajištěno dýchání
- 2,5 hodiny-mlezivo
- 2,5 dne-zabezpečit zdraví telete, kontrola příjmu krmiva a vylučování
- 2,5 týdne -pozor na výskyt nemocí
- 2,5 měsíce: pokud není schopné tele být přežvýkavcem pak musí být vyloučeno s chovu
- 2,5 roku-dospělý jedinec

## Ošetřování telat

### 1. odrohování:

- Optimální ve stáří 2-3 týdnů, nutné hlavně u volného ustájení
- Způsoby: kauterizace: elektrické zařízení které vypálí pučnice
- Louhování: používají se louhové tyčinky 10 cm dlouhé

### 2. označování:

- Dočasně označit do 72 hod by mělo být trvale označené plastové náušnice žluté jalovice,

červené nebo růžové býčci

### **3. Tetování**

### **4. kontrola zdravotního stavu**

- Kýly, dýchacích cest, výtok z očí, konzistence výkalů