

Otázka: Chov prasnic jalových, zapařtěných, březích, rodících a kojících

Předmět: Chov zvířat a veterinářství

Přidal(a): Baruu

Ustájení- musí splňovat welfare zvířat

-nesmí se zraňovat

-poskytovat optimální plochu

-dobré pracovní podmínky pro ošetřovatele

-bezstelivové rořtové ustájení

-napáječka, koryto

Jalové prasnice- 7-10 dnů

-ustájení ve skupině po 10 ks

-ustájení celorořtové nebo polorořtové (statek Měřice)

Zapařtěné prasnice- 30-35 dnů

-ustájení individuální

-eros centrum

-podlaha celá betonová, poloroštová nebo celoroštová

Březí prasnice- od detekce gravidity do 10 dní před porodem

-70-75 dnů

-ustájení skupinové

-a)stabilní skupina- 10 ks prasnic, celoroštový nebo poloroštový kotec

-b)dynamická skupina- 200 ks prasnic, odebírají a přicházejí neustále

-kotec- zóna klidu- pevná podlaha

-zóna krmení- automatický krmný box, rošty

Ustájení i na hluboké podestýlce-> starý objekt

Přistýlá se 2-3 týdne

Vývoz 1 za měsíc

Skupina 15-20 ks, Vynikající pro welfare zvířat

Krmení

Ovlivňuje výsledky reprodukce až o 20%

Kompletní krmné směsi

Prasnice se krmí restriktivně

Teplota 18-22C ve stáji

-typy- tekuté- kompletní krmná směs se smíchá s vodou

-suché dávkování (odspané)- dávkovač nasype KD do koryta

-březí prasnice BIO-FIX-> krmná místa u koryta oddělena přepážkou slouží k tomu, aby se při krmení nerušily a snědly vše

-automatické krmné boxy- nejmodernější typ (suché, tekuté i zvlhčované krmivo)

- stelivové i bezstelivové provozy

-řízené počítačem

- pro fungování musí mít čip (v uchu, za uchem nebo uložené pod kůží)

-prasnice vlezte do boxu-> box ji identifikuje kvůli čipu-> nasype jí krmivo-> prasnice krmivo sežere (box sleduje, jak rychle žere a váží nedožerky)-> vypustí ji

-selekční koncovka- slouží k oddělení jednotlivých prasnic od zbytku stáda

-převod na porodnu, zákrok, kontrola zdraví

Krmení jalových a zapuštěných prasnic

Výživa->řádně zabřeznutí a správnou fce reprodukčních orgánů

Kompletní krmná směs KPB 3,2-3,5kg denně

Krmí se 2 denně

Flushing- u hubených a vyčerpaných prasnic

- Velice dobře působí na prasničky
- Zvýšená krmná dávka 50-100%
- Týden před zapuštěním
- Zvýší se počet ovulovaných vajíček-> zvýší se počet zahnížděných plodů v děloze

Krmení březích prasnic

Zajistit- záchovu pro prasnici

-růst plodu

- rozvoj dělohy a mléčné žlázy

-přírůstek prasnice

Velice důležité

½ březosti se vytváří rezervy pro růst selat a průběh laktace

KPB 2,2-2,6 kg

2/2 nepřekrmovat-> ztloustne-> komplikace při porodu

Krmí se 2 denně

Ošetřování

1. Jalové prasnice

Hlídání ZD

Kvalitní výživa

Ošetřování

Optimální podmínky prostředí

Detekce říje

Zapaštění

1. Zapaštěné prasnice

Detekce gravidity

Nedostaví se říje po 21 dnech

Detekce říje nejdříve cca 30 dnů

Březost zjišťujeme ve slabinách a přítomnost plodových obalů

1. Březí prasnice

Chránit před nastydnutím, klid, čistota prostředí

Chov rodičích a kojících prasnic

Velice náročný

Ustájení

Zařízení-> porodna

1. Skupinové

U nás velice málo

Stelivový způsob

Maximální welfare

4-6 prasnic

Opravit by se měli během jednoho týdne

Selata se odtavují v 5-6 týdnech

1. Individuální

Nejrozšířenější

Stelivové a bezstelivové (bez častěji)

Umisťuje 5 dní před porodem

Klece jsou nastavitelné

Fixace- omezení ztrát zalehnutí selat

Kolíková napáječka, koryto

Podlaha plná nebo roštová (před korytem musí být pás plné podlahy, pod kotcem je vana se špuntem-> výkaly tečou do jímky)

Rošty jsou nejčastěji plastové

Krmení-kvalita krmení je důležitá kvůli selatům

-kompletní krmná směs

-zakládá se individuálně, dávkovaček (pro 1-2 prasnice)

-může být použit zvlhčovač krmiva

-a) prasnice rodičí- nesmí se týden před porodem překrmovat (záněty dělohy, mléčné žlázy, zadržování mléka)

-KPK 2,2-2,6 kg 2 denně, musí být k dispozici voda

-v den porodu a v den před porodem se nekrmí nebo 50% KD

1. b) kojící prasnice- musí se zajistit produkce mléka za celou dobu

-záchovu a regeneraci pohlavního aparátu

-úspěšné zabřeznutí

-prasnice z něj musí tvořit mléko

-krmí se KPK- první 3 dny 2,2-2,6kg, poté se postupně zvyšuje podle toho kolik kojí selata (na 1

sele + 0.3-0.4kg) průměrně 5,6 kg

-3 dny pře odstavem se dávka snižuje

-v den odstavu se nekrmí

-po odstavu KPK 2,2-2,6 kg

- důležité v KD tuk (zdroj energie a AMK)

Ošetřování

Nejnáročnější na ošetřování

Desinfekce porodního kotce

Šetrný přesun na porodnu

Porod pod dohledem chovatele

ZOOhygiena porodny

Nestresovat

Příprava na odstav