

Otázka: Chov telat

Předmět: Chov skotu

Přidal(a): čaky

Kategorie telete je od narození do půl roku stáří

Rozhodující období: největší ztráty

2 typy ztrát:

- **1) Přímé:** úhyn telete
- **2) Nepřímé:** snížení přírůstku, snížení zdravotního stavu, užitkovost

Správné ošetření po porodu

Rozdělení období odchovu:

- minimální standarty vyhláška číslo 2008/04

Časové členění:

1.období: Do odstavu

- Max do 56 dne věku., mlezivo, mléčné směsi

2.období: Přejícné školkové

- Do 57 max do 90 dne věku

3.období: Odstavu

- Do 90-180 dne, období rostlinné

Ustájení telete

Období mléčné výživy: individuální odchov

Optimální jsou venkovní boxy

Typy venkovních boxů

a) dřevěné

- - špatné udržování čistoty, malá trvanlivost
- + přírodní materiál, méně finančně náročné po použití je schopný recyklace

b) plast z vysoce kvalitního plastu

- + snadno čistitelné. prodyšné, dobré mikroklima, lehký na manipulaci
- - finančně náročnější

c) Plachtovna:

- + finančně méně náročné při poškození lze opravovat, vyměnit, lehká manipulace
- - horší mikroklima, možnost poškození,

d) individuální boxy pod přístřeškem

Dřívější již nevhodné technologie

- Profylaktorium: oddělená místnost, byli tam individuální klece
- Vazně s matkou: matka stála u žlabu tele bylo u ní uvázané nevhodné

Velkokapacitní teletníky:

- všechna telata z celého okresu, všichni po spolu

Období mléčné

- Úplně 1. krmení je mlezivo-první napití nejpozději do 205 hodin po narození (propustnost tenkého střeva nejvíc obranných látek)
- Na 1 napití by mělo vypít 1 kg mleziva (pozor na přepití)
- V prvních dnech 6-7* spotřeba minimálně 6-7 kg
- Musí být teplé minimálně 37 C
- Hygiena napájení bezpodmínečná po každém použití důkladně vymýt vždy čisté
- Po skončení mlezivové výživy nastává krmení mlékem

1. opravdu mlékem:

- krmení nejdražší, není trvanlivé, nejpracnější způsob, musí být čerstvé nebo úplně zkyslé(nesmí být hořké)teplé 37-38 C

2. krmení mléčnou krmnou směsí:

- běžně se vyrábějí, připravují se vždy čerstvé množství na 1 krmení, je vždy sypká a suchá

Začínáme krmit i jadrné krmivo: tzv Předstartér podává se už od 5-10 dne věku

Období přechodné

„školkové“

Typy ustájení:

- 1) skupinové boxy venkovní: plastové, dřevěné
- 2) přístřešky

Krmení: období mezi mléčnou a rostlinou výživou převážně už rostlinná složka, dostatek pitné vody neomezeně

Období pod odstavu

Nekrmí se mléko jsou odstavena pouze rostlinné krmivo (kvalitní seno, zelená píce, siláž, senáž v zimě okopaniny hlavně krmná mrkev a částečně řepa) v 5 měsících plně vyvinuty všechny trávicí orgány krmení 2* denně, stejná technologie, která bude použita jako v budoucím odchovu

Pravidlo 2,5

- 2,5 minuty-zajištěno dýchání
- 2,5 hodiny-mlezivo
- 2,5 dne-zabezpečit zdraví telete, kontrola příjmu krmiva a vylučování
- 2,5 týdne -pozor na výskyt nemocí
- 2,5 měsíce: pokud není schopné tele být přežvýkavcem pak musí být vyloučeno s chovu
- 2,5 roku-dospělý jedinec

Ošetřování telat

1. odrohování:

- Optimální ve stáří 2-3 týdnů, nutné hlavně u volného ustájení
- Způsoby: kauterizace: elektrické zařízení které vypálí pučnice
- Louhování: používají se louhové tyčinky 10 cm dlouhé

2. označování:

- Dočasně označit do 72 hod by mělo být trvale označené plastové náušnice žluté jalovice,

červené nebo růžové býčci

3. Tetování

4. kontrola zdravotního stavu

- Kýly, dýchacích cest, výtok z očí, konzistence výkalů