

Otázka: Opadavé dřeviny okrasné kůrou

Předmět: Sadovnictví

Přidal(a): Petr Pavel

Keřovité

Betula nana – Bříza trpasličí – pomalu rostoucí, 70m vysoká, větve snadno zakořeňují, l. drobné, nár. vláhu, použití ve spojení s jehličnany, skalky, vřesoviště

Berberis – dřišťál – zahrnuje opadavé i stálezelené druhy. Ostnitý keř se žlutým kv.. L. jednoduchý, na podzim červený, kv. Zapáchají, pl. Červ. Malvička (bobule), snese slunce i mírný polostín, snáší sucho a vápenaté p., použ převážně živé ploty

- **Berberis vulgaris** - Berberis obecný – 2-3m vysoký, ostny jsou trojdílné, l. pilovité, je hostitelem rzi travní
- **Berberis thumbergii** - Dřišťál thumbergův – 1-1,5m vysoký, nejcenější nízký druh, ostny jednoduch. L. drobnější, celokrajné
- *Atropurpurea* – červenolistý
- *Atropurpurea nana*
- *Aurea* – zlatožlutý

Svida alba – Svída bílá – 2m vysoká, mladé pupeny jsou lesklé, karmínově červ., pl. modrofialová peckovička, nár. daří se ji na slunci i v polostínu

- *Argenteomarginata* – bíle lemované

Svida sanguinea – Svída krvavá – mladé pruty jsou načervenalé, l. na podzim do červ., pl. téměř černá peckovička, použ. do větších krajinářských úprav

Svida stolonifera – Svída výběžkatá – 1,5m vysoká, kůra žlutozelená, použ. Na tvarované živé ploty

- *Flaviramea* – nejčastější
- *Kelesey* – načerv. až červ. borka

Euonimus europeus – Brslen evropský – 2-4m vysoký, pl. červ. Tobolka (kněžské čepičky), kv. nenápadné, l. vejčité, na podzim červ., větvičky jsou zelené, čtyřhranné, vyžaduje polostín, použ. Park, skupiny

Forsythia – Zlatice – krásné, brzy z jara kvetoucí, kv. žluté, čtyřcípé, zvonkové. Nár. plné oslunění (nesnáší přílišné vlhko ani sucho), okr. Kv. i dřevem – z jedné strany hnědou a z druhé nazelenalou s lenticely , použ. Solitéra, skupiny, živé pl., vhodná k jehličnatým dřevinám

- **Forsythia suspensa** – Zlatice převislá – 3 m vysoká, větve dlouhé, překlenné, snadno zakořeňují
- **Forsythia intermedia** – menší růst, kratší, méně překlenné, l. jednoduché, kv. bohatší. Je cennější

Rhus Tylicina – Škumpa orobincová – ze S. A., řídký, vidličnatě větvený keř nebo menší strom až 5m vysoký, rychle roste, l. lichozpeřené, větvičky silně červenohnědé, huňaté, kv. zelené sestavené v palicových latách, krásný po uzrání pl – tmavočervených, huňatých a nakyslých peckoviček. Je zcela nenáročná a otužilá, snáší sucho i vlhko, použití – krásná je zejména na podzim. Pozor na rozrůstání kořenovými výmladky.

Keria Japonka – – Zákula japonská – pochází z číny, hustý keřík, zelené větvičky, l. pilovité,

výrazná žilnatina kv. žluté (duben-květen)

- *Pleniflora* – plnokvětá
- *Picta* – bíle panašované l.

Kolkwitzia amabilis – Kolkvície krásná – z Říny, 2-3m vysoká, stará kůra se odlupuje, l. vejčité, zubaté, zašpičatělé, kv. nádherně růžové (květen-červen), pl. štětinaté. Miluje slun. Polohu, snáší sucho. Patří k nejcennějším druhům

Stromové

Betula – Bříza – 20m vysoká, meliariční dřevina (vysušuje), rekultivační (na chudé p.), kv. jehněda, samčí se rozpadají na podzim, jsou na 2letém dřevě, samičí jsou na letorostech, l. kosočtverečný, pilovitý, na podzim do žluta, rozmn. Semenem, vysévá se v zimě na sníh, Musí se přesazovat s balem

- **Betula pendula** – Bříza bílá – větvičky metlaté a převislé, borka bílá, černě rozbrázděná
- *Purpurea* – červenolistá
- *Yongii* – hnízdovitá, převyslá
- **Betula papyrifera** – Bříza papírová – mohutnější a hustší, kmen většinou dělený, kůra v mládí růžová, ve stáří čistě bílá, odlupuje se v ruličkách. L. vejčitý, na podzim do žluta, nesnáší mráz

Juglans regia – Ořešák královský – 30 m vysoký, pozdě rašící, kůra šedá, ve stáří hluboce rozbrázděná, koruna řídce větvená se silnými větvemi, l. lichozpeřené, ze spodu vonné žlázy, kv. samčí jehnědy, na jednoletá. Výhonech, samičí na letorostech, pl. peckovice v dužnatém obalu 3 pohromadě, nár. dostatek prostoru a světla, použití jako solitéra.

Platanus acerifolia – Platan javorolistý – 30m vysoký, hluboko koření, hladká borka, odlupuje se ve velkých plátech, l. jsou kožovité, laločnaté, řapík je dole ztlustlý, kvete nevýrazné, pl. je

kulovité, visí po 1-3 na dlouhé stopce, vyžaduje teplejší polohy, hlubší p., snáší sucho a znečištěné ovád.. Všestranné použ., vhodný do městského prostředí.

Robina pseudoacacia – Trnovník bílý (akát) – 20_25 m vysokýpozdě raší,borka hluboce rozbrázděná, mohutná kořen. Soustava (vysušuje p.), může se použ. Jako meliorační dřevina, koruna neprav.,kv. bílé, vonné, l. lichozpeřené, tupě zakončené, 20-30cm, lístky 5-10. Má ostny, na kořenech žijí hlízkové bakterie, medonosná r. Tvoří kořenové výmladky (zapleveluje).

- *Umbraculifera* – do uličních stromořadí, bez trnů

Salix – Vrba – rychle rostoucí stromy, l. podlohlý, kopinatý, většinou tvoří polísky, kv. jehněda, kvete před olistěním, silně alergení. Mají měkké dřevo, jsou krátkověké. Doplnková dřevina. Rekultivují (vysušují), velice dobře obráží, zapleveluje

- *Tristis* – vrba bílá smuteční – kaskádovitě převislé větvičky – žluté a tenké
- **Salix alba** – Vrba bílá – 25m, l. 5 – 10cm, pilovitý, kůra hnědozelená, na slunci zbarvuje do hnědočervena. Pro spevňování břehů
- **Salix matsudana**
- *Tortousa* – pokroucené větvičky, zelená nebo červená kůra