

Otázka: Rychlení lilkové zeleniny

Předmět: Zelinářství

Přidal(a): Petr Pavel

Rajče - Solanum lycopersicum

Požadavky:

- Zelené hnojení, kompost, průmyslově vyráběné zahradnické zeminy.
- Teplota: 18-22 C. Světlo: Denní. Voda: Pravidelná, bohatá zálivka, ne na list.
- Vzduch: Pravidelné větrání.

Odrůdy:

- Tyčkové- Stupické, Start.

Rychlení:

- Předpěstování sadby, vyséváme do truhlíčků, koncem ledna- únor, po vzejití hrnkujeme. Na stanoviště vysazujeme sadbu s prvním náznakem květu, 80 x 35 cm nebo do dvou řádků 70 x 90 x 35.

Ošetřování:

- Vyštipování, odstraňujeme postraní výhony, zaštipujeme vrchol, odplevelování.
- Ochrana proti škůdcům a chorobám- mšice, molice, svilušky, plíseň bramborová, bronzovitost rajčat, černání stonků.

Sklizeň: Sklízíme vybarvená nebo nedozrálá rajčata.

Paprika - Capsicum annum

Odrůdy: P. C. R., Ambra.

Podmínky:

- Světlo: Přirozené, můžeme i přisvětlovat, před výsadbou začneme přisvětlovat.
- Teplota: 22-28 C u vytápěného, u nevytápěného 18-23 C, nesmí v noci klesnout pod 16 C. Voda: Po výsadbě 10 dní nezaléváme, teplá, nezávadná, dostatek, vzdušná vlhkost 70%. Vzduch: Větráme, prozpívá mírný pohyb vzduchu, který podporuje samoopylení.

Pěstování:

- Semena vyséváme do truhlíček, po vzejití přepichujeme do hrnků, po jedné až dvou rostlinách. Výsadba na stanoviště do sponu 60 x 30 nebo 70 x 40 x 40.
- Vysazujeme po 1 pravém listu.

Ošetřování:

- Po výsadbě zalijeme a zhruba 10 dní nezalíváme. Odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům- regulace plodů, slimáci, svilušky, mšice, škvoři- druhotná infekce po prokousání dírkou.

- Přihnojování, větrání, nevlhčíme zbytečně listy.

Sklizeň: Probírkou, výnos- 5-8 kg/m².

Lilek - Solanum melongena

Příbuzný brambor.

Požadavky:

- Teplo: 22-26 C, v noci ne pod 16 C.
- Světlo: Přirozené.
- Vzduch: Větrání dle vnějších podmínek.
- Voda: Dostatečná, pravidelná, ne na list.
- Půda: Středně těžká, humózní.

Odrůda: Český raný.

Pěstování jako u paprik.